

Individuenverluste durch baubedingt erhöhtes Verkehrsaufkommen	
<i>Luchs</i>	3
<i>Fledermäuse</i>	2-3
<i>Reptilien</i>	4
<i>Tagfalter, Nachtfalter, Hautflügler, Käfer</i>	4

**Riedler Mulde – Walder und Waldränder (III B)**  
Ökologisches Risiko  
**Verlust an Lebensräumen durch v.a. dauerhaften Flächenentzug**

Lebensraumveränderung durch baubedingten Nährstoffeintrag		
	<i>Fledermäuse</i>	1
	<i>Reptilien</i>	2-3
	<i>Tagfalter</i>	2
	<i>Nachtfalter</i>	3-4
	<i>Hautflügler</i>	3

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung  
© BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 2021

Nachtfalter	4
-------------	---

Störung durch baubedingte stoffliche und nicht stoffliche Einwirkungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Staub, weitere optische Reize)			
Fledermäuse (Licht/Lärm)	2-3	4	

<b>Mollusken</b> (Feuchteverhältnisse in den Donauleiten, Kaltluftabfluss)	4
--	---

The content of this drawing is copyright property of the designer. The drawing was handed over to the receiver for personal use only and without our written permission it must not be reproduced or made available to any third parties. Any infringement will be prosecuted.

\* J E S - A 0 0 1 - L A P P 1 - B 4 0 0 2 9 - 2 2 - A F E = 1 & C L D 0 2 0