Bestand Vegetation

Xerotherme Eichenwälder felsiger Standorte

- Luzulo-Quercetum (LQ) *
- Luzulo-Quercetum petraeae silenetosum (LQs) *
- Luzulo-Quercetum petraeae typicum (LQt) *

Waldlabkraut-Hainbuchenwälder

- Galio sylvatici-Carpinetum betuli (GC)
- Galio sylvatici-Carpinetum betuli luzuletosum (GCl)
  - typ. Var. (GClt)
  - Var. von Silene nutans (GCls) *
- Galio sylvatici-Carpinetum betuli asaretosum (GCa)
- Galio sylvatici-Carpinetum betuli tilietosum (GCt)

Hainsimsen-Buchenwälder

- Luzulo-Fagetum (LF)
- Luzulo-Fagetum typicum (LFt)
- Luzulo-Fagetum genistetosum (LFg)
- Luzulo-Fagetum myrtilletosum (LFm)
- Luzulo-Fagetum, fichten-/ birkenreiche Ausbildung (LF-Fi / LF-Bl)

Waldmeister-Buchenwälder

- Hordelymo-Fagetum (HF)
- Dentario enneaphylliti-Fagetum (DF)

Schlucht- und Hangmischwälder

- Fraxino-Aceretum pseudoplatani (FA) *
- Fraxino-Aceretum pseudoplatani typicum (FAt) *
- Fraxino-Aceretum pseudoplatani typicum, Zahnwurz-Ausbildung (FAZ) *
- Fraxino-Aceretum pseudoplatani, Ausbildung mit armer Krautschicht blockreicher Standorte (FAB) *
- Aceri-Tilietum (AT) *

Bach-Eschenwälder

- Carici remotae-Fraxinetum (FA) *
- Carici remotae-Fraxinetum typicum (FAt) *

Bachufer-Erlenwald

- Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (StA) *

Silberweiden-Auwälder

- Salicetum albae (SA) *
- Silberweiden-Stockausschläge, in ruderal geprägten Gras- und Hochstaudenfluren (SiR)

Hartholz-Auwälder

- Querco-Ulmetum minoris (QU) *

Laubbaumforste und gepflanzte Laubbaumbestände

- Laubbaumforste und andere gepflanzte Laubbaumbestände (Pfl.)
- Mischwälder (Mi)
- Feldgehölze, Gehölzbestände auf Ranken (FG)
- Feldgehölze, Eschen-Mischgehölze (FGE)
- Einzelbäume mit Baumgruppen (E-B)

Naturferne Nadelforste

- Fichtenwälder (Fi)
- Fichtenwälder mit Buchenanteil (Fi-Bu)
- Fichtenjungbestände (Fij)
- Lärchenbestände (Lä)
- Lärchenmischbestände (Lä-...)

Vorwälder, Übergangswälder

- Vorwälder (VW)
- Dichte Stangenhölzer, z. T. mit Schlussbaumarten (VW-...)
- Birkenwälder /-gebüsche (VW-Bi)
- Birken-Silberweiden-Fiederzwenken-Bestand (VW-BiSw)

Gebüsche

- Haselreiche Waldmäntel (HW)
- Haselgebüsche auf Blockstandorten (HB) *
- Sonstige Gebüschfragmente (GS)

Heide-Gesellschaften

- Vaccinio-Callunetum (VC) *
- Cytiso-Callunetum (CC) *

Saum-Gesellschaften, Magerrasen

- Teucrium scorodonia-Schuttflur (TC) *
- Melampyrum pratense-Hieracium-Gesellschaft (MH)
- Fragment. Magerrasen (Viscario-Avenetum pratensis, VA) *
- Straßenränder mit Magerkeitszeigern und sonstige Gras- und Krautfluren (SM)
- Magerrasenbrache, verbuscht/aufgeforstet (MB) *
- Mesophiler Saum (mS)
- Wärmeliebender Saum des Trifolion medii (Tm)

Schlagfluren, sonstige Lichtungen und Ruderalfluren

- Schlagfluren (Sch)
- Calamagrostis epigejos-Gesellschaft (CE)
- Brombeer-Gestrüppe (BB)
- Holunder-Gebüsche (HG)
- Impatiens glandulifera-Flur (IG)
- Staudenknöterichfluren (SKF)
- Erigeron annuus-Flur (EA)
- Dauco-Melilotion (DM)
- Artemisio-Tanacetum (ATa)

Hochstaudenfluren

- Convolvulo-Angelicetum archangelicae (CA) *
- Filipendulo-Geranietum palustris (FU) *
- Urtico-Aegopodietum (UA)
- Fragmentarische Uferhochstaudenflur (CAf)

Felsband-Gesellschaften

- Diantho-Festucetum pallentis (FD) *
- Teucrio-Polygonatetum odorati (FT) *
- Fingerhut-Waldreitgras-Saum (FW)
- Mauerpfeffer-Flur (MF) *

Offene Block- und Schutthalden

- Offene Block- und Schutthalden (B) *

Grünland-Gesellschaften

Extensiv genutzte Wiesen trockener Standorte

- Extensiv genutzte Mähwiesen und Weiden (GE)
- Salbei-Glatthaferwiese (ArS)
- Glatthaferwiese (Ar)
- Glatthaferwiese mit Magerkeitszeigern (ArM)
- Artenreiche Extensivwiese mit Übergang zu Magerrasen (GEM)
- Extensivwiese, verbracht, verbuscht (GEv)

Extensiv genutzte Wiesen feuchter / nasser Standorte

- Nass- und Feuchtwiesen (Calthion) (GnC) *
- Scirpus sylvaticus- und Carex brizoides-Bestände (GnS) *
- Dactylo-Festucetum arundinaceae (DF)
- Flutrasen, Binsenfluren (GnB) *

Intensiv genutzte Grünländer

- Intensiv genutzte Mähwiesen und Weiden (GI)
- Intensiv genutzte Mähwiesen und Weiden, noch artenreicher (GIa)
- Intensiv genutzte Mähwiesen und Weiden mit Magerkeitszeigern (GIm)
- Intensiv genutzte Mähwiesen und Weiden mit Nässezeigern (GIn)

Sonstige Grünländer

- Obstwiesen und sonstige Grasfluren mit Einzelbäumen

Sonstige Lebensräume

- Ackerflächen (A)
- Siedlungen, Gärten
- Ablagerungen
- Gebäude
- Straßen, befestigte Wege

*** Vegetationstyp geschützt nach §30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG**

Bestand Vegetation

Bewertung floristischer Fundpunkte

- Punktuelle Vorkommen (mit Nummer)
- Lineare / flächige Vorkommen (mit Nummer)

Bewertungsstufe

- Fundpunkt mit herausragender Bedeutung
- Fundpunkt mit sehr hoher / herausragender Bedeutung
- Fundpunkt mit sehr hoher Bedeutung
- Fundpunkt mit hoher / sehr hoher Bedeutung
- Fundpunkt mit hoher Bedeutung
- Fundpunkt mit besonderer / hoher Bedeutung
- Fundpunkt mit besonderer Bedeutung
- Fundpunkt mit lokaler / besonderer Bedeutung
- Fundpunkt mit lokaler Bedeutung

Änderung Florakartierung Vergleich zur Kartierung 2010

- Neuer Fundpunkt

Schutzgebiete

- FFH-Gebiet 7446-301 - Donauleiten von Passau bis Jochenstein
- FFH-Gebiet 7447-371 - Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung
- FFH-Gebiet AT3122000 - Oberes Donau- und Aschachtal
- Amtlich kartierte Biotope

Sonstiges

- Umgriff Kartierung 2019
- Flurstücke
- Forstwege
- Wanderwege, Pfade
- aufgelassene Wanderwege, Pfade
- Rinnsale, kleine Bäche
- Schluchten
- Markante Einzelbäume



J			
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
Änd.	Datum	Name	Bemerkungen

Projekt: Energiespeicher Riedl

Planart: LEGENDE

ENERGIESPEICHER RIEDL
Ein Projekt der Donaukraftwerk Jochenstein AG

DKJ
Innstraße 121
94036 Passau
DEUTSCHLAND

Projektleitung
Am Kraftwerk 2
94107 Untergriesbach
DEUTSCHLAND

PLANERSTELLER:

Landschaft + Plan ● Passau
Passauer Str. 21, D-94127 Neuburg a. Inn
Tel: +49-08507-922053
Fax: +49-08507-922054
Mail: info@landschaftundplan-passau.de

	Datum	Name
Gez:	27.02.2020	Baumholzer
Gepr:	27.02.2020	Herrmann
Ges:	27.02.2020	Herrmann
KKS-gepr:		
Freigabe		

Anlage 3
Datenaktualisierung Vegetation und Flora – 2019
Vergleich Bestand Vegetation Kartierung 2010 und 2019
Donauleiten und Hochfläche bei Jochenstein - Legende

Freigabe AHP Fachbereich: | Plangröße: | M: | CAD-Anwendung: | GSO: | GS1FO:

Fremdfirmen–Nr. | Aufstellungsort | Blatt von Blätter

SKS					Projekt–Nr.		Ersteller		Zählteil						KKS												DCC(UAS)	
Verzeichen	S1	S2	S3	Gliederung		Gliederung		Gliederung	Bauteilnr/Typ	Gliederung	Bauteilnummer	Gliederung	Anlagenzustand	Planstatus	Verzeichen	GA	Funktion/Bauwerk				Aggregat/Raum					Verzeichen	
																G	FD	F1	F2	F3	FN	A1	A2	AN		A3		
*	A	A	A	/	A	N	N	N	/	A	A	A	A	N	/	A	N	N	N	N	N	/	N	N	/	A	A	A	=	N	N	A	A	A	N	N	A	A	N	N	N	A	&	A	A	A	N	N	N
*	J	E	S	–	A	0	0	1	–	L	A	P	P	1	-	B	4	0	4	1	7	-	0	3	-	_	F	E	=	1													&	C	L	D	0	2	0