



Bestand Vögel

Naturschutzfachlich bedeutende Lebensräume

- A** Donauufer mit Felsen, Kiesufer und Auwaldfragmenten (Gäste wie Gänsehäher, Graureiher und Kormoran)
 - B** Streuobstwiesen und Baumbestände (Feldsperling, Goldammer)
 - C** Hang- und Schluchtwälder mit Felsbereichen (Brutplätze Uhu, Mäusebussard und Wasseramsel)
 - D** Hang- und Schluchtwälder mit Felsbereichen (Brutplätze Mäusebussard, Waldkauz)
 - E** Hang- und Schluchtwälder mit Felsbereichen und Blockhalden (Brutplätze Uhu, Wespenbussard, Mäusebussard, Waldkauz, Gebirgsstelze, Wasseramsel)
 - F** Buchen-Altholzbestände am Dandlbach (Brutplätze Schwarzstorch, Hohltaube, Dohle)
 - G** Feuchtgebiet mit Weihern/Teichen (Brutplatz Teichhuhn, Gastvögel wie z. B. Waldwasserläufer und Rohrweihe)
 - H** Gehölz-/Offenlandkomplexe (Brutplätze Neuntöter, Rebhuhn und Goldammer)
 - I** Gehölz-/Offenlandkomplexe (Brutplätze Goldammer)
 - J** Acker-/Wiesenkomplexe (Brutplätze von Kiebitz, Rebhuhn, Wachtel und Feldlerche)

Brutreviere (schematisch): Größen nach Mittelwerten aus der Literatur

- Feldlerche
 -  Goldammer
 -  Kiebitz
 -  Neuntöter
 -  Rebhuhn
 -  Waldkauz

Brutbereich (schematisch): E
Raumbedarf zur Brutzeit

-  Turmfalke
 -  Dohle
 -  Mäusebussard
 -  Schwarzspecht
 -  Uhu
 -  Wachtel
 -  Waldohreule
 -  Wespenbussard

Schutzgebiete

- FFH-Gebiet 7446-301 - Donauleiten von Passau bis Jochenstein
 - FFH-Gebiet 7447-371 - Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung
 - FFH-Gebiet AT3122000 - Oberes Donau- und Aschachtal
 - Naturschutzgebiet Donauleiten von Passau bis Jochenstein

Sonstiges

- [Dashed Box] Engeres Untersuchungsgebiet
 - [Grey Line] Staatsgrenze
 - [Blue Line] Rinnsale, kleine Bäche
 - [Light Blue Box] Donau