

Springfrosch (Grasfrosch, Erdkröte, Teichmolch)												
Verlust von Laichhabitaten							Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen					
Riedler Mulde							Hochfläche					
Vegetation	Lebensraum- typ	Qualitäts- stufe	Beeintr.	Fläche ha	Faktor	CEF- Bedarf ha	Maßnahme	Lebensraum- typ	Qualitäts- stufe	Fläche ha	Aufwertungs- faktor	Fläche rechn. ha
Fischeich, aufgelas- sen	Stillgewässer	3	dauer.	0,16	3	0,49	CEF7b	Anlage Weiher Ficht	3	0,22	3	0,67
Fischeich, genutzt	Stillgewässer	1	dauer.	0,58	1	0,58	CEF7b	Anlage Weiher Ficht	3	0,39	3	1,16
Tümpel entlang des Auba- ches	Stillgewässer	3	dauer.	0,03	3	0,08						
Flutrasen, Binsenflu- ren, Ge- wässer im Biberstau	Fließgewässer	1	dauer.	0,55	1	0,55						
Summe				1,32		1,70				0,61		1,83 0,83

Tabelle 38: Bilanzierung Betroffenheit von und CEF-Maßnahmen für den Springfrosch

